



Poznań, dnia 14 września 2016 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wpłynięcie 15-09-2016

L. dz. Nr

wpłynięcie 15-09-2016

L. dz. Nr 1672/16

Zbigniew Zieliński
Przewodniczący
Zarządu Okręgowego
PZŁ w Poznaniu
ul. Libelta 37
61-707 Poznań

Nasz znak: ChZ.913.6.28.2016

Dot. sprawy nr: GIWz-410-229/2016

pismo z dnia: 31.08.2016

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dniu 13.09.2016r z Jerzym Wachowiakiem rzecznikiem prasowym ZO PZŁ w Poznaniu informuje, o bieżącej sytuacji oraz obowiązku zabezpieczania się myśliwych przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

W bieżącym roku wystąpiło w Polsce 28 przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików oraz 17 ognisk tej choroby u świń. Afrykański Pomór Świń występuje obecnie na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego oraz wschodniej części woj. mazowieckiego. Z aktualną sytuacją epizootyczną oraz regionami kraju na których są wprowadzone restrykcje, można się zapoznać korzystając ze strony internetowej <http://www.wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce>

Informuje, że Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu na swojej stronie <http://www.wiw.poznan.pl/afrykanski-pomor-swin> publikuje również przydatne informacje o tej chorobie i zabezpieczaniu się przed nią.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Istotnym elementem walki z chorobą jest przestrzegania zasad bioasekuracji przez myśliwych z terenu całego kraju, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

W związku z tym Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaleca przestrzeganie następujących zasad postępowania przez myśliwych z terenu woj. wielkopolskiego:

1. Myśliwi z terenu woj. wielkopolskiego nie powinni wykonywać polowania na obszarach podlegających restrykcjom z powodu występowania afrykańskiego pomoru świń, ze względu na możliwość przeniesienia wirusa na teren Wielkopolski (na odzieży, obuwiu, samochodzie, upolowanej zwierzynie itp).
2. Przestrzegać zasady higieny po polowaniu (zmiana odzieży i obuwia, dokładne mycie i dezynfekcja rąk, sprzętu łowieckiego). Należy mieć na uwadze, że wirus ASF wykazuje b.dużą przeżywalność w środowisku zewnętrznym. Potrafi przeżyć 18 msc w krwi przy 4°C, 105 dni w mięsie, 1000 dni w mięsie mrożonym, 280 dni w zakopanej śledzienie. Z tego względu wskazane jest stosowanie środków dezynfekcyjnych, skutecznych na afrykański pomór świń.
3. Szczególną ostrożność oraz przestrzeganie zasad jak wyżej, powinni zachować myśliwi, którzy są jednocześnie hodowcami trzody chlewnej lub mają z nią kontakt (dystrybutorzy pasz, akcesoriów hodowlanych, lekarze weterynarii itp).
Przestrzeganie zasad bioasekuracji przy kontakcie łowiectwo/hodowla świń jest również istotne z powodu występowania w populacji dzików, wirusa choroby Aujeszkiego oraz możliwości przeniesienia zakażenia do hodowli świń, co poważnie utrudniłoby uznanie terytorium woj. wielkopolskiego za urzędowo wolne od wirusa ch. Aujeszkiego u świń.
4. W przypadku znalezienia padłego lub odstrzału chorego dzika należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt. Sekcję oraz pobranie prób do badań, może przeprowadzić wyłącznie lekarz weterynarii. Informuję, że obowiązuje urzędowe pobieranie prób do badań od każdego padłego dzika, również zabitego w wyniku wypadków komunikacyjnych. Obowiązek ten dotyczy całego kraju.

Zał. informacja GLW dla myśliwych

Do wiadomości: ZO PZŁ w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile

Sporządził: T.Wielich

2 pomiaraniem

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Andrzej Zarnecki



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Afrykański pomór świń u dzików

Przed dwoma tygodniami potwierdzone zostało wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie. Tym samym wirus ASF (ASFV) znalazł się na obszarze Unii Europejskiej (UE). Biorąc pod uwagę fakt, że regulacje prawne UE zakładają, że w przypadku wystąpienia ASF na terenie jakiegokolwiek kraju wspólnoty, zamyka się obrót trzodą chlewną oraz mięsem nie w całym kraju, jak to miało miejsce w przeszłości, a jedynie w okręgach zapowietrzonym i zagrożonym, oraz mając na uwadze fakt, że ASFV może krążyć w populacji litewskich dzików, zagrożenie wprowadzenia ASFV na terytorium innych, szczególnie sąsiadujących z Litwą krajów UE, jest bardzo wysokie.

Fakt, występowania ASFV w populacji dzików stwarza potrzebę włączenia myśliwych oraz leśników w program szkolenia, którego celem jest uświadomienie roli myśliwych i leśniczych w ochronie Polski przed rozprzestrzenieniem się ASF w populacji dzików bytujących w naszych lasach, a tym samym ochronę krajowych stad świń przed wirusem ASF, który w pierwszej kolejności może znaleźć się wśród dzików.

Poniżej zostały przedstawione najczęściej zadawane pytania dotyczące ASF u dzików wraz z odpowiedziami.

Czym jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. W krajach afrykańskich - na południe od Sahary, w których choroba ta pojawiła się około 100 lat temu i występuje sporadycznie do dzisiaj, podobnie jak na półwyspie iberyjskim, gdzie ASF został zwalczony w 1999 r., wirus ASF może być przenoszony również przez kleszcze - gatunek, który w naszej strefie klimatycznej nie odgrywa istotnej roli.

Jaki jest przebieg i objawy kliniczne ASF u dzików?

U dzików europejskich infekcja prowadzi do bardzo ciężkich, ale nieswoistych objawów ogólnych, jak gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują między innymi ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików w równym stopniu i w większości przypadków prowadzi do padnięcia zwierząt w okresie 7 - 10 dni po zakażeniu.

Po przekrojeniu zwłok dzika należy zwrócić uwagę na: przekrwione i powiększone węzły chłonne, powiększoną śledzionę i wybroczyny w narządach wewnętrznych, w skórze lub pod skórą. Płuca i drogi oddechowe są często wypełnione pianą.

Brak wymienionych zmian nie wyklucza, że przyczyną nagłego padnięcia dzika, a częściej większej liczby dzików, może być ASF. Z tego powodu zauważenie zwiększonych padnięć dzików powinno stanowić sygnał do podejrzenia ASF. Sekcja dzików powinna być wykonana wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Jak choroba jest przenoszona?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia wirusa na teren naszego kraju, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń.

Na co należy zwrócić uwagę?

Wskazane jest zdawanie sobie sprawy z faktu, że aktualnie dziki mogą być ważnym wektorem we wprowadzeniu wirusa ASF do Polski i jego szerzeniu się w populacji dzików, a później świń.

Prosi się zatem myśliwych i leśników o zwrócenie uwagi na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii (PLW), bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej. Należy także pobrać próbki do badań laboratoryjnych, które zostaną przesłane do laboratorium przez PLW. Optymalne są próbki krwi i śledziony, ewentualnie węzły chłonne, migdałki, płuca, a w ostateczności, jeśli brak jest wymienionych narządów w tuszy dzika, kość długa lub mostek. Do badań mogą być przesłane nawet tkanki z postępującym procesem gnilnym.

Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże.

Prosi się myśliwych o przestrzeganie zasad higieny po polowaniach (nie pozostawianie patrochów w lesie po zakończeniu polowania; dezynfekcję sprzętu łowieckiego).

Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. Przez 48 godz. od zakończenia polowania.

Litwa jest atrakcyjnym krajem dla turystów i myśliwych. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że trofea i inne produkty z dzików mogą stanowić źródło wirusa i stwarzać ryzyko przeniesienia wirusa ASF i dalszego szerzenia się choroby. To samo dotyczy ubioru i innych przedmiotów.

Jak choroba jest zwalczana?

Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji.